

動物用医薬部外品 犬用

ユニバーサルメディケート シャンプー

Universal Medicated Shampoo




「ふけ・かゆみの防止」と「殺菌消臭」

ユニバーサルメディケートシャンプーの**特長**

1 2つの有効成分を配合 (それぞれ100mL中2g含有) ● クロルキシレノール2% ● サリチル酸2%


クロルキシレノールとは...

化粧品や抗菌石けんの有効成分として利用されているハロゲン置換フェノール系化合物です。細菌の酵素の不活性化と細胞壁の変性によって抗菌活性を発揮するものと考えられており、*in vitro* においては *Listeria* 属、*Staphylococcus* 属などのグラム陽性菌に対して優れた抗菌作用を示し、大腸菌群などグラム陰性菌、抗酸菌、ウイルスに対しては中程度の抗菌作用があると報告されています。



サリチル酸とは...

皮膚のpHを低下させることでケラチンの水和や角質細胞の膨潤を引き起こし、結果として角質溶解作用を示します。また角質細胞同士の接着物質を可溶化して、角質が落ちるのを促す作用も有します。



2 しっかりとした洗浄力

3 泡立がよく、洗いあがりかふんわり



ユニバーサルメディケートシャンプーの抗菌活性

本剤の抗菌活性について、
膿皮症罹患犬由来の *Staphylococcus intermedius* 3株、
Staphylococcus schleiferi 3株、
ヒト由来の *Propionibacterium acnes* 2株に対し、
抗菌活性を確認しております。
(※ 5,120倍以下の希釈、3分間以上の接触時間の条件において)

ユニバーサルメディケートシャンプーの安全性

安全性試験として本剤の常用量、3倍量にて1日1回3日間のシャンプーを9頭に実施し安全性を評価しました。

第1日目のシャンプー2時間後に、常用量群の雄1頭と3倍量群の雄1頭でかすかに認められる程度の紅斑を陰嚢部皮膚に認めましたが、その他に異常所見は認めませんでした。

また第2日目、第3日目においてもシャンプー使用の悪影響は認められず、本剤の安全性が確認されました。

ユニバーサルメディケートシャンプーを用いた効果確認試験

皮膚や被毛に何らかの異常のある犬51頭に対し本剤、又は対照シャンプー(サリチル酸0.5%及びクロロキシレノール1%配合の市販シャンプー)を用いてシャンプーを1回実施し、皮膚の発赤、ふけ、かゆみ、洗浄効果、毛艶及び体臭について、それぞれスコア化し、洗浄前及び洗浄後に臨床スコアを測定し評価しました。

〈結果〉

本剤は洗浄後14日の臨床スコアの全項目について洗浄前より有意に低い値を示しました。対照シャンプーでは、体臭のスコアのみ有意に低い値を示しました。臨床スコアの推移及び統計解析より、犬の皮膚・被毛の洗浄及びふけ・かゆみの防止と殺菌消臭に合致した肌トラブルを有する犬に対しての本剤の有用性が確認されました。



動物用医薬部外品 犬用

ユニバーサルメディケートシャンプー

【成分及び分量】 本品 100 mL 中

成分	分量
クロルキシレノール	2.00 g
サリチル酸	2.00 g

【効能又は効果】 犬の皮膚・被毛の洗浄及びふけ・かゆみの防止と殺菌消臭

【用法及び用量】

使用前にボトルを良く振る。あらかじめぬるま湯で体全体をぬらす。適量のシャンプーを揉み込み、体全体を洗う。しっかり泡立ったら、十分に洗い流す。

使用量の目安:小型犬(10 kg未満)	:10~30 mL
中型犬(10 kg以上20 kg未満)	:30~60 mL
大型犬(20 kg以上)	:60~90 mL

【使用上の注意】

(基本的事項)

1.守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。

(使用者に対する注意)

- ・皮膚が敏感な人、今まで洗剤等でアレルギー症状を起こしたことがある人は、使用に際して注意すること。
- ・使用後は手をよく洗うこと。

(犬に関する注意)

- ・皮膚や被毛に異常(傷、腫れ物、湿疹等)があるときには使用を避けること。
- ・眼や口に入らないように注意すること。万一入った場合は、流水で直ちに洗い流すこと。
- ・粘膜等被毛のほとんどない部分に使用すると刺激症状が認められることがあるので、これらの周辺では注意して使用すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤にはフェノール類が含まれるので、継続して使用する者は、地方公共団体の除害施設設置基準等に従い使用すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・万一身体に異常をきたした場合や誤って飲んだときは、本剤の主剤がクロルキシレノール及びサリチル酸であることを医師に告げて診察を受けること。

(犬に関する注意)

- ・犬に異常があらわれた場合は使用を中止し、獣医師の診察を受けること。

(取扱い上の注意)

- ・本剤は低温下で青白色に変化することがあるが、品質に問題はない。

(専門的事項)

その他の注意

- ・本剤の有効成分であるサリチル酸は変異原性があるとの報告がある。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 473 mL(16 oz)、3.79 L(1 Gallon)

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社 CA事業部
〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1
TEL:024-945-2332 受付時間 9:00~17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元(輸入発売元)

 日本全薬工業株式会社
ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

製造元

 ベトキノール(フランス)